Semillon rose

Vass7R03s541-545



Collection Vassal-Montpellier

0Mtp1054

The state of the s

Sémillon rose 10 R8 s-396-400









ANNEE: 1994

NOM Semillon rose. EMPLACEMENT 10 R8 1 396. 400 Bd. 43.89. mi

00	. 7 3	00.											
ouche	Nbre yeux		rrement mi/déb		Ferti- lité	Floraison début mi/f fin			Véraison début mi/v fin			Maturit é	
1 9 2 f 3 4 f 5 g	3	33	7.3×	0	Crappe Pour : Baie :		Mil.	1:		Compa	cité:	L - M -C	
) la	7-3.	94 (0)		disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur: B-Gr-Rs-Rg-N Jus: inc - coloré Saveur: s - m - ar - fox - herb Pépins: avec - apyrène Port: Vigueur:								

ANNEE: 1995 NOM Semillan rose

EMPLACEMENT 10 RP 1 396. 400

										100	
Souche	Nbre yeux		rrement mi/déb		Ferti- lité	Flo: début				raison mi/v	Maturité
1 % 2 % 3 4 % 5 %	2	13.3.	13:3,	0	Grappe Pour: Baie: Couleu Saveur Pépins Fort:	TC - 0 disc-s r : B-0 : s	ph-ell Gr-Rs- m - a	1 : - P ! -ov-ol Rg-N r - fo	Dim: bov-cy:	l-fus : inc ·	: L - N-C

ANNEX: 1996														
110	Bd. 43-89 (m)													
iche	Whre yeux	Débou début	mi/deb	Nbce grap	Ferti-	Floadebut	mi/E			mi/v	fin	Haturile		
1	f				15	12,5	20,5	29.5	29,7	3.8	68	12.9		
3	t L	14.3	18,3 *	3	Grappe: G - M - P Dim: Compacité: L - :- C									
5	14				Baie: TO - G - H - P Dim: disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus									
	D	le 18.3	36(+2)		Couleur: B-Gr-Rs-Rg-N <u>dus</u> : inc - coloré Saveur: s - m - ar - fox - herb									
					<u>Fort</u> : <u>Vigueur</u> :									
										1				

N° d'ordre :

Sémillon rose. 10 R8 s. 396-400.8-3

Désignation :

Emplacement :

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 182 - moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 cotonneux 190 - sans villosité pubescente 2/18 - sans villosité laineuse 279.

Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert 198.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etalées - en gouttière - autres.

Face inférieure : glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 aranéeuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité pubescente 280 / sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférieure

Nervures : glabre 214 - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 duveteux 2/18 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 sans villosité laineuse 283.

Limbe: glabre 220 - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 sans villosité laineuse 285.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 233.

A pétiole glabre 234 - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

Calvo 96

Nº d'ordre : Désignation : Simillon rose 10 R84-396,400.0.3

Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - côtelé. Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241. sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289. Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250. ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253.

: dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256. Noeuds ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259.

: verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263. Vrille

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

: coloré 264 - vert 265. Bourgeon

(I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit. Morphologiquement : male 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

Calvo 94

N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

Sémillon rose 10 R85-396-4000.

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142/- grande 143.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - séteux - velouté aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux 145 - velouté 146 aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 -

sans villosité pubescente 2/12) - sans villosité

laineuse 273.

limbe : glabre 150 - séteux 151 - velouté 152 aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 sans villosité pubescente 274/- sans villosité

laineuse 275.

Limbe : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface: unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyenne-

ment bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 partiellement rouge 165 - entièrement

rouge 166.

Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168/ -

entièrement rouge 169. Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen 1/71/ - court 172.

Glabre 173 - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 -

sillon - partiellement - totalement.

Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178.

Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277. partiellement - totalement.

Lalvo 93

domindontodontodontod

Formulaire de description 6/8

(après chute des feuilles)

Année:

Observateur:

Code cépage : ~ Nom cépage: Semillon rose

Code clone:

Emplacement: NO R 8 & 396-400

Sarment

oiv 101 section transversale : circulaire 1 - elliptique 3 - aplatie 5.

oiv 102 surface : unie 1 - côtelée 2 - striée 3.

oiv 103 couleur générale : jaune 1 - brunâtre Ø- rouge violacé 3 - gris 4.

oiv 104 lenticelles : absentes(1) - présentes 9.

oiv 105 densité des poils dressés des noeuds : absence 9 - présence 9

oiv 106 densité des poils dressés des entrenoeuds : absence ? - présence 9.

oiv 353 longueur entrenoeuds: très courts (<60mm) Ø- courts (90mm) 3 - moyens (120mm) 5 -

longs (150mm) 7 - très longs (>180mm) 9.

oiv 354 diamètre entrenoeuds: très petit (<5mm) 1 - petit (8mm) 3 - moyen (11mm) 5 grand

(14mm) 7 - très grand (>17mm) 9.

Vig 2/5

Porte-greffe

oiv 551 rendement en bois/ha: très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 552 formation de cal de soudure : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 553 aptitude à la rhizogenèse : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9

Vassal:

Noeuds: aplatis 1 - moyens 2 - saillants 3.